

令和5年度「加温ぶどう」病害虫防除暦 (JAながの志賀高原ブロック)

回数 散布時期 散布日 重点防除期間	IRAC FRAC コード	薬剤名	薬剤量	倍 率	散布量 (10a当り)	対象病害虫 *太字は 重点病害虫	収穫前 使用規制	年間 使用回数	主な作業と注意事項及びドリフト対策
1 発芽前 月 日	1	水 展着剤 ㊟ ラビキラー乳剤	100 ℓ 20 mℓ 500 mℓ	200 倍	250 ℓ	トラカミキリ	発芽前 (休眠期)	2 回	①今回の防除と2回目の防除間隔は5日以上空ける。 ②昨年晩腐病が多発した園はベンレート水和剤400倍(休眠期 1回)を散布する。 ③晩腐病対策として、巻きひげや収穫痕をきれいに切る。
2 発芽直前 月 日	M7 M2	水 展着剤 ㊟ ベフラン液剤 石灰硫黄合剤	100 ℓ 20 mℓ 400 mℓ 5 ℓ	250 倍 20 倍	300 ℓ	晩腐病 褐斑病 黒とう病 サビダニ	休眠期 冬期	1 回	
3 展葉 6~7枚 月 日	— M4 1	水 展着剤 オーソサイド水和剤80 ㊟ ダイアジノン水和剤34	100 ℓ 20 mℓ 125 g 100 g	800 倍 1,000 倍	300 ℓ	晩腐病 黒とう病 べと病 灰色かび病 カイガラムシ 類	30 日前まで 30 日前まで	3 回 2 回	①オーソサイド水和剤80に替えてアリエッティC水和剤800倍(収穫30日前まで 3回)を使用しても良い。 ②ジマンダイセン水和剤1,000倍(収穫45日前まで 2回)でも良い。
4 展葉 9枚頃 月 日		水 フラスター液剤	100 ℓ 200 mℓ	500 倍	300 ℓ		新梢展開葉 7~11枚時 (開花始期まで)	2 回	①農薬とは混用しない。(単用散布とする) ②生育・天候状況を確認し、適期に散布する。 ③種なしぶどうはアグレプト液剤1,000倍(満開14日前~開花始期1回)を散布する。(10a当り300ℓ) ⑤種あり巨峰はフラスター液剤500倍にアプローチBI 500倍を加用する。
5 開花直前 月 日	— 17 1 20	水 展着剤 パスワード顆粒水和剤 トクチオン水和剤 マイトコーネフロアブル	100 ℓ 10 mℓ 66 g 125 g 100 mℓ	1,500 倍 800 倍 1,000 倍	400 ℓ	灰色かび病 アザミウマ類 ハダニ類	14 日前まで 45 日前まで 21 日まで	2 回 3 回 1 回	①園内の換気、扇風機等の設置を行い、湿度対策を行う。 ②マイトコーネフロアブルに替えてダニコングフロアブル2,000倍(収穫前日 1回)を使用しても良い。
6 落花直後 月 日	3 21 13 5	水 オンリーワンフロアブル ランマンフロアブル ㊟ コテツフロアブル ディアナWDG	100 ℓ 50 mℓ 50 mℓ 50 mℓ 10 g	2,000 倍 2,000 倍 2,000 倍 10,000 倍	400 ℓ	晩腐病 黒とう病 灰色かび病 べと病 ハダニ類 アザミウマ類	前日まで 14 日前まで 60 日前まで 前日まで	3 回 3 回 2 回 2 回	①コウモリガ防除のためガットサイドSの原液~1.5倍液を主幹部に塗布するか、1.5倍液を散布する。(幼虫喰入期直前~喰入初期、但し収穫21日前まで MEP2回) ②落花直後の防除以降、アザミウマ類の発生園はアーデントフロアブル2,000倍(収穫前日まで 4回)を散布する。 ③落花直後の防除以降、コナカイガラムシ類の発生園は㊟モスピランジェットくん煙剤、収穫14日前まで 3回を使用する。 ④カイガラムシ発生園でアブロードフロアブルを加用する場合は、オンリーワンフロアブル、ランマンフロアブルに替えてアミスター10フロアブル(1,000倍 収穫30日前まで 3回以内)にする。 ⑤園内の換気、扇風機等の設置を行い、湿度対策を行う。

7 収穫後 月 日	M1	水 ICボルドー66D	100 ℓ 2.5 ℓ	40 倍	400 ℓ	べと病	—	—	①ICボルドー66Dに代えて4-4式ボルドー液を使用しても良い。 ②カイガラムシ類の発生園はモスピラン顆粒水溶剤2,000倍(収穫14日前まで 3回)を特別散布する。
8 ビニール 除去後 月 日	M1	水 ICボルドー66D	100 ℓ 2.5 ℓ	40 倍	400 ℓ	べと病	—	—	①ICボルドー66Dに替えて、4-4式ボルドー液でもよい。
9 8月下旬 ~ 9月上旬 月 日	M1 1	水 ICボルドー66D スミチオン水和剤40	100 ℓ 2.5 ℓ 100 g	40 倍 1,000 倍	400 ℓ	べと病 ブドウスカシバ	— 21 日前まで	— 2 回	①ICボルドー66Dに替えてオーソサイド水和剤80を800倍で使用しても良い(収穫30日前まで 3回以内) ②ハダニの発生園は特別散布を実施する。

※ ㊦は劇物です。購入の際は印鑑が必要です。

この防除基準はJAながの志賀高原にて作成されたものですので、地区内生産者・組合員以外の利用を固くお断りします。