

令和5年度 果樹園除草剤使用区分

効果	薬剤名	成分	RACコード	分類	りんご	ぶどう	もも	ネクタリン	あんず	うめ	桜桃	キウイ	すもも ブルーン	なし	かき	くり	くるみ	ブルーベリー	かりん マルメロ	収穫前 使用規制	使用回数	備考				
葉から吸収され根まで枯らす。	ラウンドアップ マックスロード	グリホサート	9	普	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	収穫前7日	3回以内	パイナップル除く。			
	カルナクス		9		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	収穫前7日	
	タッチダウンiQ		9		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	収穫前5日	キウイ・パイナップル除く。
	サンダーホルト007		9・14		●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	収穫前7日	
	エイトアップ		9		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	

効果	薬剤名	成分	RACコード	分類	りんご	ぶどう	もも	ネクタリン	あんず	うめ	桜桃	キウイ	すもも ブルーン	なし	かき	くり	くるみ	ブルーベリー	かりん マルメロ	収穫前 使用規制	使用回数	備考		
葉から吸収され根際まで枯らす。	パスタ液剤	グルホシネート	10	普	●(※)	●	●	●	●	●	●	●(※)	●	●	●	●(※)	×	●	×	●	×	収穫前 前日	3回以内	※りんご・キウイ・かんきつ 収穫21日。くり収穫30日。
	ザクサ液剤		10		●(※)	●	●	●	●	●	●	●	●(※)	●	●	●	●(※)	●	●	●	●	●		●

効果	薬剤名	成分	RACコード	分類	りんご	ぶどう	もも	ネクタリン	あんず	うめ	桜桃	キウイ	すもも ブルーン	なし	かき	くり	くるみ	ブルーベリー	かりん マルメロ	収穫前 使用規制	使用回数	備考				
接触した場所のみ枯らす。	㊟ プリグロックスL	パラコート	22	毒	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	収穫前 前日	5回以内	

効果	薬剤名	成分	RACコード	分類	りんご	ぶどう	もも	ネクタリン	あんず	うめ	桜桃	キウイ	すもも ブルーン	なし	かき	くり	くるみ	ブルーベリー	かりん マルメロ	収穫前 使用規制	使用回数	備考
土壌処理により発芽抑制させる。	カソロン粒剤6.7	DBN	29	普	●	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	—	1回以内	
	トレファノサイド乳剤	トリフルラリン	3	普	●(※)	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	収穫前30日	2回以内

※グリホサート・グルホシネート等を含む農薬の使用回数と作物ごとの総使用回数の範囲内で使用して下さい。

- 除草剤使用に際しては、ラベルに記載されている内容をよく読み、用法に従って使用して下さい。
- 農薬名の前に㊟と記入のある薬剤は、毒物劇物指定の剤ですので購入時に印鑑を持参下さい。

注) ご不明な点は、必ず各アグリサポート(技術員)にご相談下さい。